پروفیسر دوست محمد



بهگندر یا نواسیر (فسٹولا) Fistula. مقعد کی تین بیماریان ہین.

1. بواسير (پائيلز) Piles.

2. بهگندر (فسٹولا) Fistula.

3. شقاق المقعد (فشر) Fissure.

چونکہ پہلی مرض بواسیر کی علامات و علاج سے طبی کتب بھری پڑی ہین. جبکہ دوسرا مرض بھگندر کا کامیاب علاج کم لکھا گیا ہے. حتی کہ دور جدید کی معروف کتابون مین بھی اس کا ذکر نہین ملتا. اس لیے آج میرا موضوع بھگندر یا نواسیر ہے.

تعارف:- نواسیر ناسور کی جمع ہے. یہ انتہائی سردی خشکی کا مرض ہے. مقعد کے ارد گرد ایک سخت یتھر نما یھوڑا نکلتا ہے جس مین سوزش و درد ھوتا ہے اور یہ چمڑی کی اندرونی تہہ یعنی عضلاتی انسجہ مین نمودار ہوتا ہے۔ اور اس کا منہ بھی اندر کی طرف ہوتا ہے۔ صرف باہر ابھری ھوئی کھال ھوتی ہے جو پتھر کی طرح سخت ہوتی ہے اور مریض شدت درد سے بیٹھ نہین سکتا. اگر مریض کو قبض بھی ہو تو درد کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے. جب مرض پرانا ہوتا ہے تو مریض زندگی سے تنگ ھو جاتا ہے۔ مین نے فسٹولا کے مریض افسرون کو آفیس مین کرسی کی بجاء، چار یائی بچھائے، لیٹے آفیس کا کام کرتے دیکھا ہے۔ اسباب:- انسانی تین زهرون مین سے ایک زهر پیدا ھو کر جب پھیپھڑون مین رکتا ہے تو پھیپھڑون کو زخمی کر کے سل ریوی (ٹی بی) کا موجب بنتا ہے. جب خارج ہوتا ہے تو آنتون کی سل معوی،

جب پیشاب کے ذریعے خارج ہو تو سوزاک، اگر مقعد کے ذریعے خارج ہو تو بواسیر، گر غیر طبعی راستہ سے مقعد کے ارد گرد یہ زہر جمع ہو جائے تو نواسیر یا بھگندر کہلواتا ہے. جس طرح یہ تیزابی زہر پھیپھڑون مین زخم ڈالتا ہے، اسی طرح مقعد کے گوشت کو گلاتا ہوا آنتون تک پہنچ جاتا ہے، اور آنتون کو زخمی کر کے سوراخ بنا لیتا ہے، تب یہ مرض لاعلاج ہو جاتا ہے.

اکٹر بواسیر کے پرانے مریضون کو نواسیر ھو جاتا ہے، لیکن بغیر بواسیر کے بھی ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف صرف مریض ھی جانتا ہے.

تشخیص:- اکثر مریض اور معالج تشخیص مین غلطیان کرتے ہین. مریض آکر کہتا ہے، بواسیر ہے. اور معالج دوا دے دیتا ہے اور مریض تھوڑا افاقہ محسوس کرتا ہے لیکن مرض جون کا تون ھوتا ہے، دوا ختم ھونے کے بعد پھر تکلیف شروع.

مریض کا آنکھون سے معائنہ کرنا چاھئے. بواسیر مقعد کے اندر ھوتا ہے، اور اس کا پھوڑا مقعد کی نالی مین ھوتا ہے. جبکہ فسٹولا مقعد کے باھر ارد گرد ھوتا ہے. اور شقاق، مقعد کے اندر خشکی نما چیر ھوتا ہے. جب شقاق المقعد (فشر) کا مریض سٹول کرتا ہے تو غلاظت چیر/زخم کو لگتی ہے تو درد سے کانپ اٹھتا ہے. اسی لیئے شقاق کے مریض کو اجابت سے پہلے چیر کے اوپر کوئی مرھم لگانی کو اجابت سے محفوظ رہے چاھئیے، تانکہ غلاظت کی تیزابیت سے محفوظ رہے گا اور زخم مندمل ھونے مین آسانی ھوگی.

خدائی خدمت گار کے نام جس کی همت افزائی

نے مجھے لکھنے پر مجبور کیا. دعائون کا طالب:- پروفیسر دوست محمد لاڑکانہ.

> . قسط نمبر 2 فسٹولا اور ایلوپیتھی:-

مین نے بہت سے ڈاکٹرون کو بھی اس کی شناخت کرنے مین قاصر دیکھا ہے، سوائے سرجن ڈاکٹر کے۔ عام ڈاکٹر غلطی سے اسے عام پھوڑا سمجھ کر ھیوی اینٹی بایوٹک دیتے ہین، لیکن مرض جوں کا توں رھتا ہے سوائے سرجری کے۔ لیکن اس زھر کا مادہ موجود ھوتا ہے۔ اور سرجری کے بعد وہ آھستہ پھر یہان جمع ھونے لگتا ہے۔ اور چند سالون کے بعد پھر ڈیرے جما لیتا ہے۔ مین نے ایسے مریضون کو پانچ چھ بار سرجری مین نے ایسے مریضون کو پانچ چھ بار سرجری کراتے دیکھا ہے۔ جبکہ ایک سرجری بھی آگ سے گذرنے کے مترادف ھوتی ہے۔

فسٹولا اور هومیوپیتھی:-

میرے پاس ایسے تین مریض علاج کیلئے آچکے هین جو مختلف هومیو ڈاکٹرون سے هومیو یا الیکٹروپیتھی کا علاج کروا چکے تھے لیکن صحتیاب نہین هوئے تھے.

لاڑکانہ مین آیک ھومیو ڈاکثر سید ذاکر حسین شاہ صاحب تھے. بڑے قابل اور ماھر تھے، ساتھ سیکنڈری سکول ٹیچر بھی. ان کے مریض صحتیاب ہوئے، لیکن رٹایرمینٹ کے بعد کراچی شفٹ ھو گئے.

فسٹولا اور طب قدیم کے روایتی حکماء کی غلطیان:-

چونکہ طبی کتب مین اس کا کوئی واضح علاج درج نہین اس لیے اکٹر یہ روایتی حکماء غلطیان کرتے ہین اور مریض کو کشتہ سنکھیا، کشتہ رسکپور یا کشتہ توتیہ وغیرہ کھلاتے ہین. چونکہ یہ کشتہ جات خشک مزاج کے ہین اور مرض بھی خشکی کا ہے، اس لیے مرض تو جوں کا توں رھتا ہے لیکن مریض کیلئے کچھ زیادہ پیچیدگیان خشکی و ہچکی پیدا ہو جاتی ہین.

ھر موذی مرض کی مختلف مدارج (stages) پہلی- درمیانی- اور آخری سٹیج ھوتی ہین. اور ھر سٹیج کی دوا علیحدہ ہوتی ہے ساتھ دوسری علامات کو بھی مدنظر رکھنا ہوتا ہے.

فسٹولا کا پہلا مرحلہ:- پھوڑے کو صالح صفرا پیدا کر کے پکانا ھوتا ہے.

دوسرا مرحلہ:- اسے پھاڑ کر فاسد و گندہ مواد خارج کرنا ہے.

تیسرا مرحلہ مین اس کو مندمل کرنا ہوتا ہے۔

لیکن یہ دواساز بغیر سوچے پہلی سٹیج مین رسکپور اور سنکھیا وغیرہ کھلا دیتے ہین، جبکہ یہ آخری سثیج مین دینا ہوتا ہے. مریض تندرست تو نہین ہوتا لیکن بدظن ضرور ہو جاتا ہے. ان دوستون سے گذارش ہے کہ دواسازی کے بعد مرض کی سٹیجز اور دوا کا استعمال ضرور سیکھین تانکہ کامیاب معالج بن سکین.

واللہ مین نے کبھی کسی مریض کو زهریات نہین کھلائین. جب هربل دوا سے مرض دور هو جائے تو زهریلی و کیمیائی دوا کهلانے کی چنداں ضرورت نہین.

جاری ہے.

نوٹ:- چونکہ یہ مضمون چار پانچ قسطون پر مشتمل ہے. اس لیے مجھے لکھنے کا موقع دین تانکہ مین ھر زاویہ سے مکمل بحث و تشریح کر سکون اور اس کا کوئی بھی پہلو وضاحت سے خالی رہ نہ جائے. شکریہ

دعائون کا طالب:- پروفیسر دوست محمد لاڑکانہ.

. قسط نمبر:- 3

بهگندر یا ناسور (فسٹولا) Fistula فسٹولا اور قانون مفرد اعضاء

رب کریم قبلہ استاد حکیم انقلاب و مجدد طب صابر ملتانی رح کو اپنی جوار رحمت مین رکھے، جس نے سب سے پہلے عوام کے سامنے طب کاجدید نظریہ مفرد اعضاء اور علاج پیش کیا، جس سے یہ طریقہ علاج اتنا سائنسی بن گیا کہ اب ترقی کے مراحل طئے کر رھا ہے.

فسٹولا کا پہلا مرحلہ:- پھوڑے کو پکانا (ابتدا سے تزائد تک)

چونکہ یہ عضلاتی یا سوداوی پھوڑا ہے. اس لیے اسے پہلے صالح صفرا سے پکانا ضروری ہے. یعنی ان مراحل سے گذرنا ہوگا. (1) پھوڑے کو پکانا. (2) پھاڑ کر فاسد مواد خارج کرنا (3) پھوڑے یا زخم کو مندمل کرنا.

تو اس کو پکانے کے لیے مریض کو 1. قشری عضلاتی ملین. یا غدی عضلاتی ملین 1 گرام دن مین تین مرتبہ کھانا کھانے سے کچھ دیر بعد ہمراھ پانی دین.

2. قشری عضلاتی اکسیر. یا غدی عضلاتی اکسیر 4 چاول دن مین تین مرتبہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد ہمراھ پانی یا اجوائن پودینہ کے قہوہ سے دین. دونون ادویات ملا کر کھائین.

قبض بھی ہو تو 3. قشری اعصابی مسہل یا غدی اعصابی مسہل رات کو دین.

قبض کیلیئے یہ ملین بھی دے سکتے ہین. ملین:- سنامکی 2تولہ، اجوائن 1تولہ، نمک لاھوری 1تولہ.

خوراک ڈبل زیرو کیپسول رات کو پانی کے ساتھ

هاضمہ کی شکایت هو تو جوارش کمونی آدها چمچ صبح و شام دین

مرهم:- قشری عضلاتی اکسیر مین تھوڑا سا تیل ملا کر گاڑھی مرھم بنائین. رات کو پھوڑے لگائین جذب کرائین.

ٹکور:- پھوڑے کو جلدی پکانے کیلئے اجوائن کوٹ کر تیل مین ملا کر گرم کر کے گرم ٹکور کرین. غذا:- سب سے پہلے مریض کی غذا پر توجہ دین. غذا گرم تر سے تر گرم رکھین. دلیہ، ساگودانہ، گندم کی روٹی، بکرے کا گوشت کم مقدار مین یا اس کی یخنی، ماش یا مونگ کی دال، کھچڑی، پتون والی سبزیان، کدو، لوکی، ثنڈے، مرچ سیاہ، تاژہ پھل فروٹ، وغیرہ

پرھیز:- تمام خشک سرد سے گرم خشک غذائین بینگن، گوبھی، مچھلی، بڑا گوشت، دنبے کا گوشت، دیسی و فارمی مرغی، اچار، کولا مشروبات، هوٹلنگ، لونگ و دارچینی، سرخ و هری مرچین، كهجور اور يلاستك كا استعمال وغيره.

ھفتہ عشر دوا کھانے سے بھوڑا یک جاتا ہے. درد مین تخفیف ہو جاتی ہے اور مریض ارام کا سانس

جب پھوڑا پک جائے تو نبض غدی عضلاتی یا قشری عضلاتی ہو جاتی ہے. اب یہ ادویات بند کر کے گرم تر

سے تر گرم ادویہ دینا ھون گی.

جاری ہے. دعائون کا طالب:- پروفیسر دوست محمد لاڑکانہ.

قسط نمبر 4.

بهگندر یا نواسیر Fistula.

دوسرا مرحلہ: پھوڑے کی فاسد رطوبت خارج کرنا. (زمانہ انتہا)

نسخہ1:- آنبہ ھلدی 20گرام، ھلدی 20 گرام، آک کے زرد پتون کا پانی 120گرام مین کھرل کرین جب گولی باندھنے کے قابل ھو تو حب نخودی بنا لین. خوراک:- 1 گولی دن مین تین بار کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی کے ساتھ.

فوائد:۔ یہ نہ صرف پھوڑے کا خراب مادہ نکال کر صاف کرتی ہے بلکہ ٹی بی اور پھیپھڑون کی کینسر مین بھی مفید ہے.

قبلہ استاد حکیم بخاری.

نسخہ2:- نمک مدار اور سفوف گل بنفشہ هموزن. خوراک:- 1 سے 2 رتی تک همراه دوده صبح و رات.

ھدایات:- ان ادویات کے ساتھ مریض کو دودھ، مکھن، دیسی گھی، روغن زیتون یا بادام کی سردائی کا استعمال کرنا ضروری ہے.

نوٹ:- بھگندر کی دو اقسام ہین.

1. رسنے والا بھگندر:- یہ غدی یا قشری انسجہ مین نکلتا ہے، جس کا منہ باھر کی طرف ھوتا ہے۔ اس مین سے رطوبت و پیپ خارج هوتی رهتی ہے. کبھی بند ھو جاتا ہے، کبھی پھٹ جاتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب مریض کوئی گرم چیز، مرغ مصالحے یا مرچین کھا لے تو تکلیف بڑھ جاتی ہے. درد مین اضافہ ہو جاتا ہے. یھوڑا آھسٹہ آھستہ پکنے لگتا ہے۔ تب تک شدت کا درد ھوتا ہے۔ پھر خودبخود پھٹ کر اس سے پیپ خارج ھو جاتی ہے. کپڑے خون و پیب سے خراب ہو جاتے ھین، لیکن درد دور ھو جاتا ہے.. اس بھگندر کا علاج ڈئریکٹ گرم تر سے تر گرم ادویات سے کیا جاتا ہے. جس مین درج بالا دونون نسخے بہت کامیاب و موثر ہین. تین چار هفتون مین مریض مکمل ثھیک ہو جاتا ہے. اور کسی دوائی ضرورت

> 2. غیر رسنے والا عضلاتی بھگندر:-جاری ہے

قسط نمبر 5.

بهگندر یا نواسیر Fistula.

وسرا غیر رسنے والا عضلاتی بھگندر:- یہ نواسیر، بواسیر کا صحیح علاج نہ ہونے سے، بواسیری رطوبت و نزلہ گرنے سے مقعد کے قریب عضلاتی انسجہ مین نکلتا ہے. جس کا منہ اندر کی طرف ہوتا ہے. اور گوشت کو کھاتا ہوا آنتون تک پہنچ جاتا ہے. بڑا ھی ھٹیلہ اور نامراد قسم کا پھوڑا ھوتا ہے، جو مریض کو برباد کر دیتا ہے. مریض کو بواسیر کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اور اس کی زندگی اجیرن، کاروبار نندگی تباہ ھو جاتا ہے. جسے پہلے مرحلے مین والح صفرا سے پکانا ہوتا ہے. اگر مریض کی نبض کرم خشک ہو اور پھوڑا پک گیا ہو یا پھٹ گیا ہو تو اسے بھی قسط نمبر 4 والے نسخون کی ادویات تو اسے بھی قسط نمبر 4 والے نسخون کی ادویات غلاظتین خارج ھو جائین گی.
غلاظتین خارج ھو جائین گی.

بتی کرنا:- بعض دفعہ پھوڑا پھٹنے کے بعد بہت اندر تک گہرا ہوتا ہے. اس لیے اس کا انگریزی نام Fistula (نالیدار زخم) ہے. معالج مرهم سے بتی کو لت پت کر کے روزانہ اس نالیدار زخم مین ڈالتا رهتا ہے. تانکہ جلدی صاف ہو کر بھرنے لگے. جسے سندھی مین ولوئی ڈالنا کہتے ہین. یہ کام ایک قابل معالج ھی کر سکتا ہے. خاص طور پر جو صرف چمڑی کے امراض پھوڑے، پھنسی کا کام کرتے ہین.

بڑے ماھر ہوتے ہین. اکثر بتی کرنے کی ضرورت پیش نہین آتی، یہ دونون نسخے کامیابی سے کام کر جاتے ہین.

نمک مدار (آک) بنانے کی ترکیب:- ایک بڑے جوان آک کے پودے کو جڑ سمیت اکھاڑ کر سایہ مین خشک کر دین. بعد ازاں اس کی راکھ بنا لین. اور اس کو پانی مین گھول کر گھنٹہ گھنٹہ بھر وقفے سے کسی لکڑی یا چمچے کی مدد سے ہلاتے رھین. تین دن کے بعد نتھرا ہوا پانی چھان کر دیگچی مین ڈال کر اس قدر پکائین کہ تمام پانی جل کر نمک رھ جائے.

نوٹ:- اگر مریض کو بواسیر بھی ہو تو اسے بواسیر کی دوآئی بھی دین. جس کے لیے یہ نسخہ بھی مفہد ہ

نسخہ برائے بواسیر:- رسونت مصفی 2تولہ، مغز نبولی 2 تولہ، قلمی شورہ بریان 2تولہ، مولی کا یانی 16 گنا.

ترکیب:- رسونت کو مولی کے پانی مین پکائین. جب گاڑھی ہونے لگے، تو آگ سے اتار لین اور پسی ہوئی باقی ادویہ ملا کر حب بقدر نخود بنالین. خوراک:- 1 سے 2 گولی، صبح و شام همراہ پانی

جاری ہے.

تحقیق و تحریر:- پروفیسر دوست محمد لاڑکانہ.آخری قسط.

بهگندر یا نواسیر Fistula.

تیسرا مرحلہ، نواسیر کے زخم کو مندمل کرنا(مرض کا زوال) نواسیر کا زخم صاف ھو جائے تو مندرجہ ذیل دوا دں:

نسخہ 1: گوگل مصفی، سفوف چھلکہ ریٹھا، چاکسو، کچور انار (پھل) کا چھلکہ. ھموزن. خوراک: - حب بقدر نخود یا 2 سے 4رتی. دن مین

رب پاک کے فضل سے کلی آرام آ جاتا ہے۔

نسخہ 2 :- روغن نیم خود ساختہ.

خوراک:- 5 سے 7 قطرے مکھن مین لپیٹ کر نہار منہ نگلین. بیحد مصفی خون ہے دوغن نے مندالیں کے منخصکہ لگانے کہائے دہ

روغن نیم نواسیر کے زخم کو لگانے کیلئے بھی استعمال کرین.

روغن نیم نکالنے کا طریقہ:-جس طرح بادام کا روغن نکالا جاتا ہے اسی طرح مغز تخم نیم کو ڈنڈے کونڈی مین گھوٹ کر روغن نکالا جا سکتا ہے۔

نسخہ 3 :- مصفی خون گولیان.

ھوالشافی:- سینور، جرفل، دھماسہ، کاکنج، شاھترہ، سنا مکی ھر ایک 5 تولا. کاسنی، ھلیلہ زرد ھر ایک 4 تولا. عشبہ، چرائتہ ھر ایک 3 تولا. تربد 2 تولا. نیم کے سبز پتے 5 تولا.

ترکیب:- نیم کے پتون کے علاوہ تمام ادویہ کا سفوف بنالین. کپڑ چھان کر پھوگ مین 1 بوتل عرق گازبان اور نیم کے پتے ڈال دین. صبح آگ پر چڑھائین. آدھا پانی خشک ھو تو اتار لین ٹھنڈا ھونے پر چھان کر سفوف ملاکر، گولیان بقدر نخود بنالین

خوراک:- ایک گولی همراه پانی دن مین 3 بار

نوٹ:- گولی نگلنے کے بعد دودھ، دودھ سے بنی اشیاء اور چائے سے 3 گھنٹہ تک پرھیز لازمی ہے. فوائد:- نواسیر و شوگر کے زخمون کو ٹھیک کرتی ہین. عام پھنسی پھوڑہ کے لئے بھی مجرب ہے. نسخہ 4:- سنیاسیون کے بقول پیاڑ کو بھوبھل مین بھرتہ کر کے ناسور کے رسنے والے زخمون پر باندھا جائے، تو ناسور ختم ھو جاتا ہے.

لیکن اس پر کوئی چیز باندھنا آسان نہین اس کیلئے بھی ٹیکنک چاھئے.

طریقہ:- پہلے کمر پر پٹی بیلٹ کی طرح باندھنا چاھئے. پھر دوسری پٹی سے ناسور پر پیاز رکھ کر، پٹی کا ایک چھیڑہ کمر کی پچھلی جانب کمر والی پٹی سے اور دوسرا چھیڑہ اگلی طرف لا کر کمر والی پٹی سے باندھین.

هدایات:- مریض کی پرهیز کامل صحتیابی تک جاری رکھین.

صحتیابی مین . سے 3 ماہ کا عرصہ لگ جاتا ہے، مرض کی شدت و خفت، معالج کی قابلیت، اور مریض کی مستقل مزاجی پر منحصر ہے. رب پاک تمام مریضون کو شفا بخشے. آمین. دعائون کا طالب:- پروفیسر دوست محمد لاڑکانہ.

پروف ریڈنگ سبحان رضا قادری